

# Constance.

Een midden vroeg consumptieras met een prachtige gele huid en lichtgele vleeskleur.

- ✓ Prachtige uitstraling
- ✓ Midden vroege rijptijd
- ✓ Vrij vastkokend



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** J.L. Spijkman
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2044
- ⊙ **Kruising:** MARABEL x AR 93-1243
- ⊙ **Zaailingnummer:** SA 02-0020

## Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**
- ⊙ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 6,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	licht blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groei scheuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	zeer gevoelig / 4,5

Onderwatergewicht	358
Drogestofgehalte	19,7%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,3

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

# Constance.

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	zeer vatbaar / 4,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 3
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 7
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 15%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 15%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
35/55: 36 cm (37000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Constance vatbaar is.

## Oogst

Drie weken wachten met rooien na loofdoding is noodzakelijk, omdat Constance zeer gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet gevoelig voor stootblauw. Constance groeit diep in de rug.

## Bewaring

Constance heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)