


Een midden vroeg consumptieras met een goede opbrengst en tevens geschikt voor thuisfrites.

- ✓ Goede bakkwaliteit
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging
- ✓ Brede resistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2029
- ⦿ **Kruising:** RIANTA x RENSKA
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 87-0039

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	groen
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht	375
Drogestofgehalte	20,4%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,9

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	vatbaar / 5,5
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5,5
Virus Yn	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Poot niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor potten.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het potten geeft een betere knolzetting. Eventueel 1x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)

35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Artemis vrij vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Artemis weinig gevoelig is voor rooibeschaadiging en niet gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Artemis heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 8 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl