

Een laat consumptieras met een uitstekende schurftresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Grote knollen
- ✓ Hoge knolzetting



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Saatzucht Berding
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2028
- ⦿ **Kruising:** NENA x DUNJA
- ⦿ **Zaailingnummer:** NKG 86-1158

## Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Vers

**R**

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	geel / 7
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	onregelmatig / 5
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	niet getest / -
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	380
Drogestofgehalte	20,7%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,4

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	weinig vatbaar / 7
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te verbreken.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Milva zeer vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Milva weinig gevoelig is stootblauw en gevoelig voor rooibeschatiging.

## Bewaring

Milva heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)