


Een midden vroeg consumptieras met een mooie huid, geschikt voor de retail en thuisfrites.

- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Goede resistentie tegen aardappelmoeheid en virus



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** N.Ö.S.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⊙ **Kruising:** LADY FELICIA x B 92/135/267
- ⊙ **Zaailingnummer:** NO 02-0562

## Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**
- ⊙ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	geel / 7
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	345
Drogestofgehalte	19%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,7

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6,5
Frietkwaliteit	goed / 7,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	weinig tot niet gevoelig / 8
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	weinig vatbaar / 7
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	zeer vatbaar / 3,5
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5,5
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)  
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Laudine vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Laudine gevoelig is voor rooibeschatiging en weinig gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Laudine heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

[www.agrico.nl](http://www.agrico.nl)